NOTE XXII.

HISTÉRIDES ET ANTHICIDES NOUVEAUX DU MUSÉE DE LEYDE.

DÉCRITS PAR

S. de MARSEUL.

Histeridæ.

1. *Hololepta sternincisa*, spec. nov.

Long. 10—12 mm.; larg. 3—6 mm. — Ovale, atténué postérieurement, subdéprimé, noir luisant. Tête large, à peine pointillée, sans strioles, dent préoculaire petite, mandibules longues arquées. Pronotum (3,5/10) sinueux à la base, arqué sur les côtés, strie marginale entière, avec une fossette ronde accolée ♂, assez éloignée de l'angle antérieur, strie dorsale longitudinale médiane fine et courte. Elytres (4/11), sillon subhuméral un peu raccourci aux deux bouts, 1—3 stries dorsales graduellement raccourcies, un seul appendice apical, parfois accompagné de points. Propygidium marqué de chaque côté d'une strie peu longue et par derrière de points espacés; pygidium à points condensés. Dessous de la tête profondément creusé, avec une carène jugulaire. Prosternum bifurqué au bord antérieur. Jambes antérieures munies de 4 dents mousses.

Diffère du *semicincta* par sa taille plus grande, son prosternum incisé, la fossette du pronotum ♂ bien plus éloignée de l'angle. — Cette espèce se place avant *semicincta*.

Près des *sternincisa* viennent des exemplaires ♂ qui ne semblent en être que des variétés, sinon des hybrides: la fossette marginale, placée à la même distance de l'angle antérieur du pronotum, est réduite à un gros point superficiel, et la strie marginale est presque effacée; l'échancrure de l'extrémité antérieure du prosternum est encore visible, mais bien moins profonde. N'ayant pas vu de passages, il est possible que ces exemplaires constituent une espèce particulière, qu'on pourrait appeler *parvifossa.*

Hab. Niam-Niam: Afrique centr. (Schlüter).

2. *Pachycrærus Ritsemæ*, spec. nov.

Long. 4 mm.; larg. 2,5 mm. — Oblong, subparallèle, assez convexe, bleu foncé, noir métallique, antennes et pattes rouge brun. Tête finement pointillée, largement concave, épistome rebordé, séparé du front par une strie fine. Pronotum rebordé dans son pourtour, à points peu serrés sur le dos, faibles sur le milieu, angles antérieurs aigus, creusés en dessus. Ecusson concave. Elytres lisses, marquées d'une strie subhumérale externe entière, sans interne, de 1—3 dorsales entières, 4e raccourcie un peu au delà du milieu, 5e avant, suturale entière; épipleures lisses, bisillonnées. Pygidium rugueusement ponctué, comme le propygidium. Strie marginale du mésosternum obsoléte en devant. Jambes antérieures 4-dentées.

Ressemble en petit à l'*amethystinus*, mais il est moins convexe et en diffère par la longueur de la strie suturale, l'existence d'une striole entre le front et l'épistome, la ponctuation pygidiale dense, forte et rugueuse.

Hab. Liberia: Junkriver (Stampfli).

3. *Hister robusticeps*, spec. nov.

Long. 11 mm.; larg. 8 mm. — Ovale allongé, rétréci par derrière, un peu convexe, noir luisant. Tête large et transverse, rebordée d'une strie, droite au devant de l'épistome; labre sinué et creusé. Pronotum longé de 2 fortes stries latérales, parallèles, interne à peine obsolète en devant, externe raccourcie aux yeux. Elytres marquées de fortes stries, 1—3 dorsales entières, très enfoncées à la base, perdues au bout dans une forte rugosité, 2e coudée, 4e un peu raccourcie à la base, 5e avant le milieu, suturale nulle, humérale forte, 2 subhumérales, interne commençant par des gerçures grosses, externe mince, droite, rapprochée et à peine raccourcie en avant; épipleures à 2 sillons rugueux. Pygidium plan, très densément pointillé. Mésosternum profondément incisé et pénétré par le prosternum, à strie marginale interrompue. Jambes antérieures fortement tridentées, marquées en dessous de rides transverses.

Cette espèce, du groupe du *gigas*, tient le milieu pour la taille entre le *robustus* et le *major*, se distingue à première vue de ses voisins, par ses doubles stries latérales du prothorax et subhumérales des élytres; mais n'ayant que trop peu de points de comparaison, c'est avec hésitation que je le décris comme espèce.

Hab. Niam-Niam: Afrique centr. (Schlüter).

4. *Hister Leseleuci*, spec. nov.

Long. 8—10 mm.; larg. 6—7 mm. — Ressemble beaucoup au *striolatus*, mais ovale, plus court et plus convexe; à stries disposées de la même manière, mais bien plus fortes et plus profondes, suturale et 5e dorsale surtout plus raccourcies en avant, mandibules convexes et non creusées, pygidium plus fortement ponctué; prosternum tronqué à la base, appuyé, mais sans s'y enfoncer, sur le bord antérieur du mésosternum; le métasternum lisse et déprimé, tandis que sa moitié postérieure est densément et très distinctement pointillée; bords latéraux du prothorax garnis en dessous de cils courts, moins serrés et roux.

Le *striolatus* est du Sénégal, et même des Bogos, et, au dire de M. Desbrochers, d'Algérie, qui en a décrit un individu de cette dernière provenance sous le nom de *compressus*; le *Leseleuci*, que nous dédions au Dr. de

Léséleuc, est plus méridional et plus rapproché de notre méridien.

Hab. Liberia: Junkriver (Stampfli); Humpata (van der Kellen); Grand-Bassam.

5. *Hister humpatanus*, spec. nov.

Long. 6 mm.; larg. 4 mm. — Ovale allongé, assez convexe, noir luisant. Tête pointillée, front plan, séparé de l'épistome par une forte strie arquée; mandibules creuses. Pronotum fortement ponctué sur les côtés, strie marginale fine, bien marquée, interrompue seulement au milieu du bord antérieur, stries latérales fortes, externe cessant à l'angle oculaire, raccourcie à la base, où elle se rapproche graduellement de l'interne, qui est entière et sans coude. Stries dorsales des élytres fortes, 1—3 entières, 4e très courte, 5e apicale, suturale remontant jusqu'au quart; subhumérale interne droite, bien marquée, (complétée par de courtes linéoles dans un exemplaire); épipleures trisillonnées. Pygidium densément et subrugueusement ponctué ainsi que le propygidium. Mésosternum fortement rebordé, subsinué. Jambes antérieures fortement tridentées.

Se place avant *helluo*, dont les côtés du pronotum ponctués sur les stries lui donnent un faux air, mais ses stries sont fort différentes, sur les élytres comme au pronotum, sa forme est plus allongée et étroite, ses mandibules sont concaves, etc.

Hab. Humpata: Afrique austr. (Veth et van der Kellen).

Anthicidæ.

1. *Formicomus humeralis*, spec. nov.

Long. 2,2 mm.; larg. 0,8 mm. — Etroit, allongé, lisse, luisant, noir. Antennes atteignant les élytres, peu épaisses, à 1ers articles bruns, dernier article acuminé, presque aussi long que les deux pénultièmes ensemble.

Tête ovale, bombée. Prothorax plus étroit, lagéniforme, à collet bien accusé, fortement étranglé au delà du milieu, portion antérieure globuleuse, sans sillon médian, basale plus étroite, bilobée. Elytres deux fois plus longues, à épaules marquées, ainsi que les bossettes de chaque côté de l'écusson, déprimées derrière l'épaule et marquées, au fond de la dépression, d'une tache blanchâtre transverse triangulaire, dilatées en courbe au delà du milieu, convexes, inclinées et largement arrondies au bout; garnies de lignes de poils gris, assez longs, sémidressés, rares. Pattes brunes, un peu roussâtres à la base et à l'extrémité.

Présente un peu l'aspect du *prætor*, mais il est encore plus petit, plus noir, et dépourvu de sillon médian prothoracique.

Hab. Serdang: Sumatra orient. (Dr. B. Hagen).

2. *Anthicus bisbicinctus*, spec. nov.

Long. 2 mm.; larg. 0,6 mm. — Large, assez court, assez luisant, garni de poils jaunâtres fins et couchés sur le pronotum et longs mi-dressés sur les élytres, points un peu écartés sur la tête, très serrés et fins sur le pronotum, et plus forts sur les élytres. Tête en triangle, tronquée postérieurement, légèrement convexe sur le front, brunâtre; yeux peu saillants, ovales, latéraux, rapprochés de l'insertion antennaire; dernier article des palpes fortement sécuriforme. Antennes dépassant l'épaule, testacées, 1er article obconique, ainsi que 2, mais bien plus long, 3—6 moniliformes, les autres transverses, plus larges, bruns, dernier obconique, plus gros et plus long. Prothorax roux-ferrugineux, large, en trapèze, aussi ou plus large que la tête, brusquement rétréci et muni d'un col rebordé et bien distinct, angles antérieurs en pointe obtuse, côtés rétrécis peu à peu en ligne droite, base tronquée, faiblement rebordée. Ecusson petit, en demi-cercle. Elytres 3 fois aussi longues et 2 fois plus larges que le prothorax à la base, coupées droit en devant avec les angles arrondis, non saillants en bossette; d'abord subparallèles sur les côtés, élargies en courbe après le milieu, puis rétrécies vers l'extrémité; 1er tiers d'un rouge plus clair que le prothorax, le reste noir avec une fascie rouge transverse, un peu au delà du milieu; on pourrait aussi bien décrire les élytres rouges avec une fascie transverse submédiane et l'extrémité noire. Abdomen noir; pattes longues, grêles et testacé clair.

La forme de son prothorax place cette espèce dans la section du *bimaculatus*, où elle fait contraste par ses couleurs et sa taille très petite.

Hab. Médan: Sumatra orient. (W. Dates).